Comment fait-on le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde ?

La polyarthrite rhumatoïde peut devenir handicapante , c'est pour cette raison qu'elle est nécessaire de la diagnostiquer le plus tôt possible afin de commencer un traitement efficace rapidement.

L'examen clinique n'est pas suffisant pour le diagnostic , le médecin doit alors prescrire des analyses du sang et des examens radiologiques.

Analyses médicales

un bilan témoignant de l'inflammation sera demandé (vitesse de sédimentation , protéine C réactive), ainsi que d'autres examens évocateur de la polyarthrite rhumatoïde (facteur rhumatoïde, anticorps anti-CCP).

Examens radiologiques

les radiographies standard sont demandés à la recherche de dommage articulaire (radio des 2 mains , 2 pieds et des articulations atteintes) parfois votre médecin sera amené à prescrire une échographie ou une IRM selon votre cas.

Bilan pour écarter autre diagnostic

explorations minimales (anticorps anti nucléaires, hémogramme, créatinine, transaminases, radiographie du thorax)

Seule votre rhumatologue pourra confirmer le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde .

Association Marocaine de Recherche et d'Aide aux Rhumatisants
Siège social : Service de Rhumatologie, Hôpital El Ayachi, Salé - Web : www.amrar.org.ma

الجمعية المغربية للبحث العلمي ومساعدة مرضى الروماتيزم
AMRAR
Association Marocaine de Recherche et d'Aide aux Rhumatisants